



Cochinilla Rosada

La cochinilla rosada es una plaga de gran importancia económica que afecta a los cultivos de cítricos y a los cultivos de hortalizas. Esta plaga es originaria de América Latina y se ha extendido por todo el mundo.

Los síntomas de la cochinilla rosada son:

- Presencia de insectos pequeños y de color rojo en las hojas y frutos.
- Deformación de las hojas y frutos.
- Caída de las hojas y frutos.

Para controlar la cochinilla rosada se recomienda:

- Realizar inspecciones periódicas de los cultivos.
- Eliminar los insectos manualmente.
- Utilizar productos químicos registrados para el control de esta plaga.

Para mayor información:

Se puede encontrar más información sobre la cochinilla rosada en el sitio web de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

El objetivo de la FAO es mejorar la vida de las personas que viven en zonas rurales. Para ello, la FAO trabaja en colaboración con los gobiernos y las comunidades locales.

La FAO ofrece asesoramiento técnico y financiero a los países en desarrollo. También realiza investigaciones y publica informes sobre temas relacionados con la agricultura y el desarrollo rural.

La FAO es una de las agencias especializadas de las Naciones Unidas. Su sede está en Roma, Italia.

Cochinilla Rosada del Hibisco

Aspidiotus perniciosus (Cress.)

Esta plaga es originaria de América Latina y se ha extendido por todo el mundo. Afecta a los cultivos de cítricos y a los cultivos de hortalizas.

Los síntomas de la cochinilla rosada del hibisco son:

- Presencia de insectos pequeños y de color rojo en las hojas y frutos.
- Deformación de las hojas y frutos.
- Caída de las hojas y frutos.

Para controlar la cochinilla rosada del hibisco se recomienda:

- Realizar inspecciones periódicas de los cultivos.
- Eliminar los insectos manualmente.
- Utilizar productos químicos registrados para el control de esta plaga.

Triptico Out