

Culiacán, Sin. 25 de agosto de 2015.

BOLETIN INFORMATIVO: PLICÓN AMARILLO DEL SORGO.

Debido a las altas temperaturas y a la humedad relativa que se hiso presente en los últimos dias puede haber un incremento de la plaga de puigin amarillo en los sorgos de temporal, principalmente en los municipo de Culliscin y Navolato, por lo que el CESAVISIN a través de las Justas Locales de Sandial Vegetar i enforaran las actividades de muestros de la plaga en todo el Estado y determinar los niveles de infectación, complementando esta actividad con la liberación de cryoso y en alguno de loc casos con bieración de carbinals a find emanteren in equilibrio entre la plaga y los insectos beneficos.

Por el momento la quiglión amarillo del sorgo se encuentra estable por lo que se recomienda a los productores tener sus lotes bajo observación, destruir el zacate Johnson que se encuentra endedor del cultor y solo en caso de que clamorto biológico se was rebasado por la plaga, tomas la decisión de realizar alguna aplicación de inescricida.

Debido a que la plaga inicia sus ataque por las orillas del cultivo presentándose en manchones, se puede aplicar precisamente en esco manchones o bien iniciamente realizar una aplicación por las cabeceras del predio utilizando insecticidas recomendados.

Av. Luis González Obrigón, Col. Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, México, C.P. 80140 Tel: +52 (667) 500 20 50 al. +52 (667) 500 20 60. www.cisavesin.org.mx