

Manejo fitosanitario del sorgo

¡Alerta con el pulgón amarillo del sorgo!



Productor de sorgo, es indispensable sembrar semilla tratada para proteger tu cultivo las primeras tres semanas posteriores a la emergencia, si la semilla no está tratada, tú puedes hacerlo, si tienes dudas acude al CESAVESIN o la Junta Local de Sanidad Vegetal correspondiente.



Eliminación de hospederos.

Es importante mantener tus predios libres de hospederos silvestres, como el zacate ahogado, ya que es donde se hospeda el Pulgón Amarillo cuando no hay cultivo de sorgo, de ahí emigran los primeros adultos alados que invaden el cultivo cuando comienza el crecimiento.



Liberación de insectos benéficos.

Cuando se detecten focos de infestación en hospederos, y desde la emergencia de la planta, se debe realizar la liberación de insectos depredadores benéficos como chinches y carámbanos, los cuales regulan la población de Pulgón Amarillo manteniéndola en niveles bajos.



Revisión del cultivo.

Se debe revisar el cultivo una vez por semana, desde las orillas hacia el centro del predio. El pulgón amarillo del sorgo se encuentra en la parte de abajo de la hoja, también se puede ver la mancha presente sobre las hojas escurecida por los pulgones.



Control químico.

Si la población de la plaga rebasa los umbrales económicos, se opta por la aplicación de productos químicos biotecnológicos para que no afecten la fauna benéfica. La aplicación de productos químicos dependerá de la que indique el manifiesto, la que puede ser un análisis del predio, aplicación en el glóbul o manchones donde está presente el plagu, o bien, una aplicación total.

DEPORQUES
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Teléfono: 0662 940 94 94
www.cesavessin.org.mx
presidencia@cesavessin.org.mx
Facebook: Cesavessin

Alerta Fitosanitaria
Teléfono gratuito 01 (800) 98 79 879
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx



SENASICA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

1 / 1